



BULETIN DE AVERTIZARE NR 14/359/04.05.2017

**TRATAMENT PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR LA SPECII SAMBUROASE
PRUN**

Viespea semintelor de prun(Eurytoma schreineri)

Daunatorul ierneaza ca larva complet dezvoltata in samburii fructelor atacate si dezvoltata o singura generatie pe an.Zborul maxim al adultilor coincide fenologic,de regula,cu desprinderea caliciului.Femela depune oul in samburele crud al fructelor verzi ,abia legate .Intr-un fruct este depus un singur ou,iar prolificitatea unei femele ajunge pana la 120 oua.La inceput prunele infestate nu se pot distinge de cele sanatoase ,diferentierea facandu-se mai tarziu ,cand fructele incep sa cada din pom.Fructele raman mai mici fata de cele sanatoase ,au aspect clorotic cu tenta violacee,o usoara asimetrie si un inceput de vestejire .In anii cu infestari masive, frecventa fructelor atacate ajunge pana la 90%.



Produse recomandate:

LASSER 240SC-0,06%(insecticid biologic ,actioneaza prin contact si ingestie;are eficacitate de durata) *sau*

NURELLE D 50 /500 EC-0,08%(insecticid cu spectru larg de actiune combate adultii si stadiile larvare in livezi ,**toxic pentru albine**) *sau*

MOVENTO 100SC-1,875l/ha (insecticid care prezinta caracteristica unica a unei sistemacitati totale ascendente si descendente precum si perioada lunga de protectie)

Momentul aplicarii tratamentului: tratamentul se aplica la **7-10 zile** de la caderea petalelor,in momentul desprinderii caliciului de pe fructele abia formate.

Pentru combaterea moniliozei se va adauga: CHORUS 50 WG-0,45kg/ha sau TELDOR 500SC-0,08%

CIRES,VISIN

Pentru combaterea moniliozei si a patarilor de frunze se va aplica:

TOPAS 100 SC-0,05% (produs omologat pentru patarea frunzelor si monilioza) *sau*

TELDOR 500 SC-0,08%(pentru prevenirea si combaterea moniliozei)

PIERSIC

Pentru combaterea moniliozei si basicarii frunzelor:

CHORUS 50WG-0,45kg/ha (pentru combaterea moniliozei) + **BRAVO500SC-0,15%**(pentru combaterea basicarii frunzelor) *sau*

SCORE 250 SC-0,02%(pentru combaterea moniliozei,basicarii si fainarii)

Alte recomandari:

- Este indicat a se utiliza un ingrasamant foliar care accelereaza cresterea si dezvoltarea si care maresteste rezistenta la boli si la factorii de stres(**Cropmax sau Atonik,FoliMAXBorON Plus sau Terra-Sorb Complex** sau alt ingrasamant foliar care sa contina macro si microelemente

- Pentru protecția albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind măsurile pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.205 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România - Romapis , privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

- Producătorii agricoli sunt obligați să întocmească **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor** (conform modelului transmis). Conform **Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67**, utilizatorii profesioniști de produse de protecția plantelor au obligația să păstreze pe o perioadă de cel puțin 3 ani evidența produselor de protecția plantelor pe care le utilizează.

- Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor (**SMR 10**)

- Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>)

- Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.

- Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

Intocmit, ing. Ciobanu Maria