



## TRATAMENT PENTRU COMBATAREA BOLILOR SI DĂUNĂTORILOR LA POMII FRUCTIFERI

Pentru combaterea viermelui marului si viermelui prunului (generatia doua, tratamentul II) si alti daunatori care produc atac in livezi in aceasta perioada(insecte miniere, paduchele verde la mar, molia pielitei ,paduchele cenușiu la prun, omizi defoliatoare) se va aplica unul din urmatoarele produse :

**FASTAC 10EC-0,02%** sau

**KARATE ZEON-0,015%** sau

**KAISO SORBIE-0,015%**

Sunt insecticide piretroide cu actiune prin contact si ingestie omologate pentru combaterea daunatorilor mentionati. Este foarte important ca produsul utilizat sa fie aplicat astfel incat sa asigure acoperirea uniforma a plantelor cu solutie.

Pentru combaterea rapanului si fainarii la mar si par, a moniliozei si patarii rosii a frunzelor la prun se va adauga unul din urmatoarele produse:

**CAPTAN 80WDG-0,15%** (produs omologat pentru combaterea rapanului, patarii rosii si moniliozei)

**FOLPAN 80WDG-0,15%** pentru combaterea rapanului marului si 0,2% pentru patarea rosie si ciuruirea frunzelor prunului) sau

**DELAN PRO-2,5l/ha** ( pentru combaterea rapanului la mar si par )

Sunt produse de contact care asigura protectie 7-8 zile in conditii climatice normale.

**In livezile in care este atac de fainare** se va adauga produsul **BUMPER 250EC-0,03%** (produs sistemic, se absoarbe prin toate tesaturile verzi, si are actiune preventiva si curativa) sau se poate aplica produsul

**CYFLAMID-0,45l/ha** care asigura un control eficient in combaterea fainarii; se aplica singur ( nu se amesteca cu alte produse)

**Momentul aplicarii:** tratamentul se va aplica in perioada 11.07.-14.07.2017

### Alte recomandari:

Este indicat a se aplica un ingrasamant foliar cu calciu ( 3-4 tratamente, la intervale minim 14 zile intre tratamente) ; se poate utiliza **FOLIMAX CALCIUM PLUS** , **CALCIFOL**, **NICASOL** sau alte formule existente in fitofarmacii ; tratamentele cu calciu previn aparitia putregaiurilor fiziologice, a necrozelor, ingalbenirii si caderii frunzelor, reduc sensibilitatea la lovire, maresc rezistenta merelor la depozitare.

*\* Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 l/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România - Romapis , privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.*

\*Producatorii agricoli sunt obligati sa întocmeasca **Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor** (conform modelului transmis ). Conform **Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67**, utilizatorii profesioniști de produse de protectia plantelor au obligatia sa păstreze pe o perioada de cel puțin 3 ani evidenta produselor de protectia plantelor pe care le utilizează.

\*Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor ( **SMR 10** )

\* Respectati cu strictete conditiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatatii agricole, asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> )

\* La realizarea amestecurilor se va verifica compatibilitatea pesticidelor ;

\* Efectuati tratamentul pe timp linistit, fara vânt , dimineata sau seara evitand temperaturile ridicate ;

\* Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor si pe cele de securitate si protectia muncii.

\* Cititi cu atentie si respectati măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.

Intocmit, ing. Ciobanu Maria