



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SUCEAVA

Str.Universitatii nr.3

Loc.Suceava

Telefon: 0230558314

Fax: 0230558314

BULETIN DE AVERTIZARE NR 46/696/18.08.2017

Pentru combaterea bolilor și daunătorilor în livezile de pomi fructiferi se vor efectua noi tratamente după cum urmează:

La speciile mar și par pentru combaterea **rapanului, moniliozei și pentru prevenirea bolilor de depozit** se va aplica:

BELLIS-0,8kg/ha (fungicid polivalent cu două substanțe active în componenta-piraclostrobin și boscalid- cu acțiune preventivă și curativă în combaterea fainării și rapanului; produsul este formulat sub formă de granule dispersabile în apă, ambalat la 1kg; produs extrem de eficient în combaterea **bolilor de depozit**; se pot aplica maxim 4 tratamente pe sezon cu un interval de 8-14 zile între acestea *sau*

TOPSIN M 70-0,07% (fungicid cu spectru larg de acțiune omologat pentru combaterea rapanului, fainării și moniliozei)

Pentru combaterea **acarienilor (acarianul roșu al pomilor-Panonychus ulmi, acarianul brun al pomilor-Bryobia rubrioculus)** se va adăuga: **NISSORUN 10WP-0,03%** *sau* **NOVADIM PROGRES-0,07%**.

Acarienii sunt daunători polifagi care atacă toate speciile pomicele dar și vita de vie, arbuștii fructiferi și ornamentalii; acarienii înteață și sug seva din frunze și ca urmare a atacului, țesăturile se depigmentează, iar coloritul frunzelor este modificat în alb-argintiu la început și apoi ruginiu. Frunzele puternic atacate cad prematur.

În livezile în care s-a identificat atac al **paduchelui din san-jose-Quadraspidiotus perniciosus**, este indicat a se utiliza unul din insecticidele recomandate în buletinele de avertizare anterioare. (**MOSPILAN 20SG-0,025-0,03%** *sau* **PYRINEX QUIK-0,1%** *sau* **TREBON 30EC-0,03%**)

La prun se va aplica pentru combaterea **moniliozei** :

MERPAN 50WP-0,25% (omologat și pentru combaterea patării roșii a frunzelor) *sau*

ROVRAL 500SC-0,1%, funcție de precocitatea soiurilor, se pot aplica 1-2 tratamente astfel încât să se asigure minim 7 zile timp de pauză.

Tratamentul se aplica în perioada: 18.08-22.08.2017

Pentru combaterea moniliozei și pentru prevenirea bolilor de depozit tratamentul se va repeta la mar utilizând :

BELLIS-0,8kg/ha (timp de pauză = 7 zile) *sau*

ROVRAL 500SC-0,1% (se pot aplica 1-2 tratamente până la începutul apariției culorii specifice a fructelor; (timp de pauză = 14 zile) *sau*

SWITCH-1kg/ha (se recomandă 1-2 tratamente înainte de recoltarea fructelor; dacă se aplica 1 tratament, trebuie aplicat cu 7 zile înainte de recoltare; dacă se aplica 2 tratamente, primul va fi aplicat cu 14 zile înainte de recoltare, urmat de al doilea cu 7 zile înainte de recoltare.

In livezile in care s-a constatat atac al **moliei pielitei fructelor –Adoxophyes reticulana,gen a II a**,se va aplica unul din urmatoarele insecticide:

NURELLE D 50/500EC-0,08% (produs omologat si pentru paduchele lanos), **timp de pauza 14 zile sau AFFIRM-3-4 kg/ha**

Alte recomandari:

* Respectati timpul de pauză mentionat pe ambalajul produsului pe care îl utilizati ;

** Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide(Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului;15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.205 încheiat între Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.*

**Producatorii agricoli sunt obligati să întocmească Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor (conform modelului transmis). Conform Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii profesioniști de produse de protectia plantelor au obligatia să păstreze pe o perioada de cel puțin 3 ani evidenta produselor de protectia plantelor pe care le utilizează.*

**Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor (SMR 10)*

* Este interzis pășunatul în livezile tratate ;nu efectuati tratamente in timpul zilei la temperaturi ridicate ;

* Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor si pe cele de securitate si protectia muncii.;

* Cititi cu atentie si respectati măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.

Intocmit,ing. Ciobanu Maria