

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 46 din 01.07.2026
TRATAMENT PENTRU COMBATAREA BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA CEAPĂ ȘI USTUROI

Pentru prevenirea și combaterea bolilor la legumele bulboase, sunt necesare tratamente periodice, preventive și curative, intervalul dintre tratamente se va adapta în funcție de condițiile climatice, presiunea de infecție a bolilor și evoluția culturii.

Pe lângă bolile prezentate în **buletinul de avertizare nr.27 din 08.06.2026** (Mana cepei, Alternarioza cepei și prazului, Putregaiul bacterian al bulbilor de ceapă), legumele bulboase pot fi afectate în această perioadă și de alte boli:

Putregaiul cenușiu (Botrytis allii) - atacul se observă pe frunze și bulbi, prin apariția unor pete albicioase, circulare sau ovale, în dreptul cărora tesuturile se adâncesc. Dacă este umiditate ridicată, pe tesuturile atacate apare un puf cenușiu, iar plantele pier. Plantele mature prezintă o putrezire la baza coletului, urmată de putrezirea părții superioare a bulbilor. În timpul vegetației, infecția este asigurată de sporii duși de vânt sau de apa de ploaie și de irigație.

Putregaiul alb al cepei și usturoiului (Sclerotium cepivorum) - plantele sunt atacate în toate stadiile de vegetație. Primul simptom fiind îngălbenirea și uscarea vârfului frunzelor, care progresează lent spre baza acestora. Rădăcinile sunt distruse și are loc o putrezire umedă a tunicilor, urmată de acoperirea acestora cu un miceliu alb. Dacă infecția bulbilor se produce târziu, putrezirea acestora continuă și în depozite. Plantele aflate în soluri reci și umede sunt mai sensibile.

*mana**putregaiul cenușiu al cepei**putregaiul alb la ceapa*

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare, utilizând unul dintre produse, după caz:

Pentru combaterea manei:

ZORVEC ENICADE (oxatiapipropilin) - **0,2 l/ha** - produs sistemic pentru combaterea manei la ceapă și usturoi;
timp de pauza 7 zile *sau*

CAPTAN 80 WDG (CAPTADIN) – **0,15 % (1,5 kg/ha)** - timp de pauza 14 zile *sau*

BANJO 500 SC/CARTALA – **0,04 % (0,4 l/ha)** – se poate aplica până la definitivarea formării bulbului și are
timpul de pauza de 14 zile - fungicide de contact ce asigură protecția culturii timp de 7- 8 zile, în condiții climatice
normale. *sau*

poate fi utilizat (alternativ), unul dintre fungicidele recomandate în buletinul de avertizare **nr. 27 din 08.06.2026**

Pentru combaterea putregaiului cenușiu și putregaiului alb:

BOTREFIN - **1 kg/ha** - timp de pauza 14 zile *sau*

SWITCH 62,5 WG - **1 kg/ha** - timp de pauza 14 zile *sau*

LS CYPRO-FLUDIO – **1 kg/ha** - timp de pauza 14 zile *sau*

VITISAN / VITIPROTECT- **5 kg/ha**- timp de pauza 1 zile

MOMENTUL APLICĂRII TRATAMENTULUI: 02.07.2026 – 04.07.2026

Numărul de tratamente se adaptează în funcție de evoluția condițiilor climatice, care pot influența presiunea de infecție a bolii; starea fitosanitară a culturii și în funcție de perioada de protecție a produselor utilizate.

Dacă au loc fenomene climatice extreme, grindină, vânt puternic, pentru reducerea pierderilor provocate de acestea, se vor efectua tratamente imediate pentru cicatrizarea rănilor și refacerea țesuturilor afectate, utilizând produse care conțin cupru sau captan. Produsele pe bază de cupru și captan au efect cicatrizant, acționând și în direcția prevenirii și combaterii infecțiilor micotice și bacteriene.

DĂUNĂTORI

Numai dacă se depistează atac al **dăunătorilor** prezentați în **buletinul de avertizare nr.14 din 30.04.2026** peste pragul economic de dăunare, în soluția de stropit se va adăuga unul dintre insecticidele:

MOSPILAN 20 SG – 0,2 kg/ha	<i>sau</i>	MAVRIK 2F - 0,05%.
DELTAM - 5 - 8 ml/10 litri de apă	<i>sau</i>	KARATE ZEON - 0,02%

Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la legumele bulboase, pot fi utilizate și alte produse omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest ; parola: guest)

♦ Se recomandă ca la aplicarea tratamentelor să se utilizeze un adjuvant care să asigure o bună aderență a soluției pe frunzele cerate și să permită îmbunătățirea pătrunderii soluției în plantă. Se poate folosi produsul SILWET L 77 - 0,025% - 0,05% sau SPRAYGARD – 100 ml / ha sau BREAK TRU sau alt produs omologat.

Se va respecta cu strictete timpul de pauză indicat pe ambalajul produsului pe care îl utilizați (timpul minim de la aplicarea produsului până la recoltare).

METODE DURABILE: metode biologice, biotehnice, fizice, mecanice și alte metode nechimice, trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al agenților de dăunare; (strategii și tehnici de gestionare integrată a dăunătorilor, principii ale agriculturii ecologice)

ALTE RECOMANDĂRI:

- ♦ Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- ♦ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- ♦ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);
- ♦ Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.
- ♦ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.
- ♦ Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în **Adresa de informare nr. 136 din 05.02.2026 a Oficiului Fitosanitar Suceava**.
- ♦ Pentru a se evita acumularea reziduurilor de pesticide în produsele vegetale/pentru evitarea fenomenului de rezistență a agenților fitopatogeni, folosiți pentru tratamentele dintr-un sezon, PPP din grupe chimice diferite.
- ♦ Nu se efectuează tratamente fitosanitare la viteze ale vântului mai mari de 4 m/s.
- ♦ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, **pe platforma FITS <https://fits.anfd.ro>**
- ♦ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente.
- ♦ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. Eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. etc

Responsabil Prognoza și Avertizare
ing. Platon Maria